Alcool modifié 70°

Indication

- Antisepsie des petites plaies superficielles et peu étendues.
- Préparation de la peau avant injection ou ponction.

Posologie

VOIE CUTANEE.
Appliquer sur la surface à traiter au moyen d'une compresse.
Jeter la compresse après usage.

Contre-indications

- Tout antécédent d'hypersensibilité à l'un des composants, notamment la tartrazine (ou sensibilisation de groupe).
- Ne pas appliquer sur les muqueuses (alcool à 70°).
- Ne pas utiliser sous pansement occlusif (majoration du risque de sensibilisation).
- Ne pas utiliser chez le nourrisson en-dessous de 30 mois (présence de camphre).

Interaction

Compte tenu des interférences possibles (antagonisme, inactivation...), l'emploi simultané ou successif avec d'autres antiseptiques est à éviter.

Précautions d'emploi

- Usage externe. Ne pas avaler.
- L'alcool ne doit pas être utilisé pour la pratique des alcoolémies.
- Tenir compte de la présence de tartrazine dans cette formule, en particulier chez les sujets polysensibilisés.
- Ne pas appliquer sur les muqueuses (alcool à 70°C).
- Ne pas utiliser sous pansement occlusif (majoration du risque de sensibilisation).
- L'alcool peut être irritant sur les tissus lésés.

Effets secondaires

La tartrazine est susceptible d'entraîner une sensibilisation.
Les réactions sont croisées entre la tartrazine et l'aspirine.
Risque de réactions allergiques, notamment cutanées.

Référence	Taille	Conditionnement
609086	1 litre	Carton de 12
609084	5 litres	L'unité
609085	10 litres	L'unité

LABORATOIRES
GILBERT