

# SURFA'SAFE Premium



Mousse détergente  
désinfectante  
parfumée



- Concept breveté
- Parfum frais
- Formulé sans alcool
- Efficacité antimicrobienne rapide : bactéries y compris BHR, Rotavirus... dès 3 min.
- Mousse compacte évitant tout surplus de produit

PRÊT A  
L'EMPLOI



## INDICATIONS

Mousse détergente désinfectante parfumée, destinée au nettoyage et à la désinfection des surfaces, convient pour les revêtements de table d'examen et d'auscultation.

## CARACTERISTIQUES

### SECURITE

- SURFA'SAFE R Premium est un détergent désinfectant formulé sans alcool.
- Son distributeur de mousse compacte permet de limiter la formation d'aérosol et la volatilité des composants.
- Sa mousse compacte évite tout surplus sur les surfaces à traiter.
- Sa formulation optimise la compatibilité avec les matériaux, notamment à base de polymères (polycarbonate, ...).
- Biocide de type 4 pouvant être utilisé sur les surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires, suivi d'un rinçage.

### EFFICACITE

- Nettoyage, désinfection de désodorisation en une seule opération.
- Large spectre antimicrobien et temps de contact optimisé.
- Le distributeur de mousse permet une meilleure adhérence aux surfaces à traiter.
- La formulation innovante de SURFA'SAFE R Premium permet d'étendre les domaines d'application du produit.

### SIMPLICITE

- SURFA'SAFE R Premium est un produit prêt à l'emploi.
- Sa gachette rouge (spécificité du distributeur mousse) facilite l'identification de SURFA'SAFE R Premium.
- Sa formulation permet le séchage rapide des surfaces.

# SURFA'SAFE Premium



Mousse détergente désinfectante parfumée

## MODE D'EMPLOI



1

**Appliquer la mousse** détergente désinfectante sur la zone à traiter ou de préférence sur un non-tissé.



2

**Répartir la mousse** sur la zone à traiter.



3

**Laisser sécher.** Ne pas rincer (sauf si la surface est susceptible d'être en contact avec les denrées alimentaires, la peau ou les muqueuses). Respecter le temps de contact selon l'activité antimicrobienne recherchée.

## COMPOSITION

Chlorure de didécyl diméthyl ammonium (N°CAS 7173-51-5 : 3 mg/g), excipients.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (précautions d'emploi établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques). Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Stockage : entre +5°C et +35°C.

Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces en contact ou non avec les denrées alimentaires (Groupe 1 - TP 2 & 4) - usage réservé aux professionnels.

## PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

| Actif sur          | Normes                                                                                         | Temps de contact   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Bactéries</b>   | EN 1040, EN 13727, EN 13697, EN 14561                                                          | <b>3 minutes</b>   |
|                    | EN 13727 sur BMR et BHR                                                                        | <b>1 minute</b>    |
|                    | EN 13697 sur BMR et BHR                                                                        | <b>2 minutes</b>   |
| <b>Levures</b>     | EN 1275, EN 13624, EN 13697, EN 14562                                                          | <b>15 minutes</b>  |
| <b>Moisissures</b> | EN 1275, EN 13624, EN 13697, EN 14562                                                          | <b>20 minutes</b>  |
| <b>Virus</b>       | Selon EN 14476 : Rotavirus                                                                     | <b>30 secondes</b> |
|                    | Selon EN 14476 : Herpesvirus, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia virus* | <b>1 minute</b>    |
|                    | Selon EN 14476 : Polyomavirus SV40                                                             | <b>5 minutes</b>   |
|                    | Selon EN 14476 : Norovirus                                                                     | <b>30 minutes</b>  |

\* Le Robert Koch Institute recommande l'utilisation de désinfectants avec la revendication "begrenzt viruzid wirksan", soit activité virucide limitée, pour interrompre la chaîne de transmission. Selon cet Institut, l'activité virucide limitée correspond à une activité sur virus de la vaccine et BVDV

## CONDITIONNEMENT

1 12 flacons de 750 ml  
avec distributeur de mousse.....2478.764



1